

## Informationsblatt zu Scharlach und Streptokokken-Angina

Streptokokken der Gruppe A sind Bakterien, die u. a. lokale eitrige Entzündungen des Rachens und der Mandeln (**Angina**) sowie **Scharlach** verursachen.

**Die Ansteckung** erfolgt durch Tröpfcheninfektion, z. B. Anhusten oder Anniesen.

**Die Inkubationszeit**, d. h. die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Krankheitszeichen beträgt meist 1 – 3 Tage, selten länger.

**Krankheitszeichen** sind Fieber, Halsschmerzen, Lymphknotenschwellung, evtl. Bauchbeschwerden und Erbrechen. Bei typischem Scharlachverlauf kommt ein charakteristischer Hautausschlag hinzu. Komplikationen können z. B. sein: Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, Herz- und Nierenschäden sowie rheumatisches Fieber.

Die **Dauer der Ansteckungsfähigkeit** kann bei Erkrankten, die nicht antibiotisch behandelt werden, bis zu 3 Wochen betragen. Nach Beginn einer wirksamen antibiotischen Therapie erlischt die Ansteckungsfähigkeit nach 24 Stunden.

**Behandlung:** Zur Vermeidung von Komplikationen sollte eine antibiotische Behandlung durchgeführt werden.

**Die Wiederezulassung in eine Gemeinschaftseinrichtung** (z. B. Kindergarten/Schule) ist bei einer Antibiotikatherapie und ohne Krankheitszeichen ab dem zweiten Tag möglich, ansonsten nach Abklingen der Krankheitssymptome.

**Der Ausschluss von Kontaktpersonen** ist nicht erforderlich. Kontaktpersonen sollten jedoch über ein Infektionsrisiko und die möglichen Krankheitszeichen informiert sein.

**Immunität:** Es werden spezifische Abwehrstoffe gebildet. Da es jedoch verschiedene Erregerstämme gibt, kann man mehrmals, auch kurz hintereinander an einer durch Streptokokken bedingten Infektion erkranken.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gesundheitsamt oder an Ihren Haus- bzw. Kinderarzt.

Ihr  
Gesundheitsamt